


Αυξάνονται οι θάνατοι από καρκίνο του



καρκίνος στο πάγκρεας αναμένεται να προκαλέσει αυξημένους θανάτους στην Ευρώπη, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, το 2014 και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες μορφές καρκίνου, εκτός από αυτόν του πνεύμονα στις γυναίκες, εμφανίζουν μειωμένη θνησιμότητα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των φύλων και των χωρών.

Ερευνητές από την Ιταλία και την Ελβετία, με επικεφαλής τον καθηγητή Κάρλο Λα Βέκια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μιλάνο, εκτιμούν ότι φέτος 41.300 άνδρες και 41.000 γυναίκες θα πεθάνουν από καρκίνο του παγκρέατος στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν, «τα αυξημένα ποσοστά θανάτου συνιστούν πηγή ανησυχίας, επειδή γι' αυτό τον καρκίνο η πρόβλεψη είναι δυσοίωνη, με λιγότερο από 5% των καρκινοπαθών να επιβιώνουν πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση».

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι «καθώς τόσο λίγοι ασθενείς επιβιώνουν, η αύξηση στους θανάτους σχετίζεται στενά με την αύξηση των σχετικών περιστατικών» και

συμπληρώνουν ότι «αυτό καθιστά τον καρκίνο στο πάγκρεας προτεραιότητα για την αναζήτηση καλύτερων τρόπων πρόληψης, ελέγχου και θεραπείας».

Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η κατανάλωση αλκοόλ και το οικογενειακό ιστορικό παγκρεατικού καρκίνου αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση της νόσου, για την οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια υποσχόμενη θεραπεία

Συνολικά από καρκίνο προβλέπεται ότι το 2014, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην Κροατίας), θα πεθάνουν 1.323.600 άνθρωποι (742.500 άνδρες και 581.000 γυναίκες).

Παρόλο που σε απόλυτους αριθμούς οι θάνατοι από καρκίνο εμφανίζονται αυξημένοι σε σχέση με το 2009 (λόγω και της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης), τα ποσοστά θνησιμότητας εμφανίζουν διαχρονική πτωτική τάση, της τάξης του 7% για τους άνδρες και 5% για τις γυναίκες.

Ειδικά δε από το 1988, χρονιά που καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι από καρκίνο, έχει σημειωθεί μείωση 26% στη θνησιμότητα από καρκίνο μεταξύ των ανδρών και 20% μεταξύ των γυναικών, παρά τη γήρανση του πληθυσμού.

Στους άνδρες της Ευρώπης, η θνησιμότητα από τις τρεις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο (πνεύμονα, εντέρου και προστάτη) εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μείωση 8%, 4% και 10% αντίστοιχα μεταξύ των ετών 2009 και 2014.

Στις γυναίκες, ενώ οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού και εντέρου θα εμφανίσουν πτώση κατά 9% και 7% αντίστοιχα, οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα θα αυξηθούν κατά 8%, κάτι που πρωτίστως αποδίδεται στο κάπνισμα.

Πηγή: karfitsa.gr