

Καρκίνος οισοφάγου: Ποια είναι τα ανησυχητικά σημάδια

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Ο καρκίνος του οισοφάγου εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες άνω των 60 ετών. Αν και είναι άγνωστης αιτιολογίας, έχουν αναγνωριστεί αρκετοί προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η στένωση, προηγούμενοι όγκοι της κεφαλής και του τραχήλου, χρόνια κάπνισμα κλπ.

Συμπτώματα

Κατά τα πρώιμα στάδια της νόσου ο ασθενής μπορεί να αναφέρει:

- αίσθημα πληρότητας, πίεσης, δυσπεψίας
- υποστερνικό καύσο
- γαστρεντερική δυσφορία
- δυσφαγία
- απώλεια βάρους

Ο βαθμός της δυσφαγίας ποικίλλει, ανάλογα με την έκταση της βλάβης, από ήπια δυσφαγία που εμφανίζεται μόνο μετά από την κατάποση στερεάς τροφής (ιδίως κρέατος) μέχρι τη δυσκολία να καταπιεί χοντροκομμένες τροφές ή ακόμη και υγρά. Ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για βράγχος φωνής (από διήθηση του λαρυγγικού νεύρου), χρόνια βήχα (πιθανότατα από εισρόφηση), ανορεξία, εμέτους και αναγωγές τροφών.

Ο ασθενής μπορεί επίσης να αναφέρει άλγος κατά την κατάποση ή άλγος που αντανακλά στη ράχη.

sukoti Αυτό το έχετε διαβάσει;

Καρκίνος στο συκώτι: Ενδείξεις και συμπτώματα

Αντιμετώπιση

Ο καρκίνος του οισοφάγου διαπιστώνεται τις περισσότερες φορές όταν είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο, γι' αυτό η θεραπεία είναι παρηγορητική παρά θεραπευτική. Η θεραπεία για τη διατήρηση της βατότητας του οισοφάγου περιλαμβάνει τη διάταση του αυλού, τη θεραπεία με λέιζερ, την ακτινοθεραπεία και την τοποθέτηση ενδοαυλικών σωλήνων για τη γεφύρωση του όγκου.

Η ριζική χειρουργική επέμβαση μπορεί να εξαιρέσει τον όγκο και να οδηγήσει σε εκτομή μόνο του οισοφάγου ή του οισοφάγου και του στομάχου μαζί.

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορεί να επιβραδύνουν την αύξηση του όγκου.

Πηγή: onmed.gr