



μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς και της «κακής» χοληστερόλης (LDL) κάτω από 70mg/dL, μετά τη χορήγηση της συνδυαστικής θεραπείας με εξετιμίπη και σιμβαστατίνη, επιβεβαιώνουν νέα δεδομένα από τη μελέτη IMPROVE-IT, που παρουσιάστηκαν προσφάτως στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Επίσης, επιβεβαιώνεται το μακροχρόνιο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου φαρμακευτικού συνδυασμού.

Ο συνδυασμός σιμβαστατίνης και εζετιμίμης και η εζετιμίμη ως μονοθεραπεία έχουν σήμερα ενδείξεις χορήγησης σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία, στους οποίους η αγωγή με στατίνη θεωρείται ακατάλληλη ή δεν είναι ανεκτή για τη μείωση των αυξημένων επιπέδων της LDL χοληστερόλης, σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή.

Με βάση τα αποτελέσματα από την κλινική μελέτη IMPROVE-IT, έχει υποβληθεί αίτηση στον ΕΟΦ με στόχο να λάβει νέα ένδειξη χορήγησης ο συνδυασμός σιμβαστατίνης και εζετιμίμης, αλλά και η εζετιμίμη ως μονοθεραπεία, για τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Πηγή: tovima.gr