

10 Οκτωβρίου 2016

Σπορά αρωματικών φυτών και βοτάνων!

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)





ΑΝΙΘΟΣ-ANETHUM GRAVEOLENS

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 10-21 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.5-1.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 15

Μεταφύτευση: Ανάλογα τις συνθήκες ανάπτυξης συνήθως 20-30 ημέρες μετά

Ωρίμανση: 40 ημέρες μετά την μεταφύτευση

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ-ARTEMISIA

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 23 C περίπου

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.1 εκατοστά επιφανειακή σπορά

Ημέρες βλάστησης: 10-20

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-BASILICUM

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε την άνοιξη όταν οι

θερμοκρασίες είναι 23-30 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.1 εκατοστά επιφανειακή σπορά

Ημέρες βλάστησης: 5-10

Μεταφύτευση: Συνήθως 10-15 ημέρες μετά

Ωρίμανση: 30-50 ημέρες μετά την μεταφύτευση

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ-ROSMARINUM OFFICINALIS

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 12-23 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 15-25

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΘΥΜΑΡΙ- THYMUS VULGARIS

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 15-21 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0-0.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 15-25

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ-CORIADUM SATIVUM

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 10-21 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.5-1.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 6-12

Μεταφύτευση: Συνήθως 25 ημέρες μετά

Ωρίμανση: 50 ημέρες μετά την μεταφύτευση

ΣΕΛΙΝΟ-ARIUM GRAVEOLENS

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 15-21 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια:

Φεβρουάριος-Μάρτιος

Βάθος φύτευσης: 0.5-1.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 10

Μεταφύτευση: Ανάλογα την ποικιλία και της συνθήκες ανάπτυξης συνήθως 20-30 ημέρες μετά

Ωρίμανση: 90-130 ημέρες μετά την μεταφύτευση

ΛΕΒΑΝΤΑ-LAVENDULA ANGUSTIFOLIA

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 20-30 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.1 εκατοστά επιφανειακή σπορά

Ημέρες βλάστησης: 30-40

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ-PETROSELINUM CRISPUM

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη έως το φθινόπωρο όταν οι θερμοκρασίες είναι 10-29 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος

Βάθος φύτευσης: 0.5. Μουσκεύουμε τους σπόρους για 24 ώρες πριν την σπορά.

Ημέρες βλάστησης: 10-20

Μεταφύτευση: συνήθως 20-30 ημέρες μετά

Ωρίμανση: 70-100 ημέρες μετά την μεταφύτευση

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ-ORIGANUM MAJORANA

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 18-23 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0 εκατοστά επιφανειακή σπορά

Ημέρες βλάστησης: 8-15

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΡΙΓΑΝΗ-ORIGANUM VULGARE

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν

οι θερμοκρασίες είναι 18-23 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0 εκατοστά επιφανειακή σπορά

Ημέρες βλάστησης: 4-10

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ-SALVIA OFFICINALIS

Εποχή σποράς - Θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη όταν οι θερμοκρασίες είναι 15-21 C

Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος

Βάθος φύτευσης: 0.5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 15-25

Μεταφύτευση: Συνήθως τον επόμενο χρόνο

Ωρίμανση: Συγκομιδή από την δεύτερη χρονιά

Πηγή: proionta-tis-fisis.com